

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

OFTALMOLOGIA

Página 1/1

Revisão:

Emissão: 03/09/2015

Tarefa: Preparação do paciente para consulta oftalmológica

Executante: Enfermeiro e Técnico de enfermagem

Frequência: Semanal Nº 04 18/01/2021

Assinatura:

Análise Crítica: Aprovado:

Data: Data:

Resultado Esperado: realização da consulta com eficiência.

Recursos Necessários:

- 1. EPI (luvas de procedimento);
- 2. Álcool a 70%;
- 3. Colírio:

Assinatura:

- 4. Pomada:
- 5. Algodão;
- 6. Esparadrapo;
- 7. Gaze:
- 8. Soro fisiológico a 0,9%;
- 9. Agulha 25 x 0,7 mm;
- 10. Almotolia com álcool gel.

Atividades:

- 1. Lavar as mãos:
- 2. Realizar assepsia da máquina a cada troca de paciente;
- 3. Pingar colírio conforme idade (seguir as orientações do passo a passo em anexo);
- 4. Aguardar o tempo necessário (seguir as orientações do passo a passo em anexo);
- 5. Passar na máquina;
- 6. Encaminhar para o consultório oftalmológico;
- 7. Organizar a sala ao término dos exames;
- 8. Higienizar as mãos;

Cuidados Especiais: Comunicar a enfermeira a necessidade de substituir ou solicitar reparos dos materiais danificados ou que apresentem resultados duvidosos.

Responsável pela elaboração: Coordenação de Enfermagem					
Data e assinatura:					

OFTALMOLOGIA DRª. JOHAN

0 - 5 anos

15 min.

30 min.

1º gota Mydriacyl ---> 2º gota Mydriacyl ---> Máquina (Exame)

5 – 32 anos

15 min.

30 min.

1º gota Mydriacyl ---> 2º gota Cicloplégico ---> Máquina (Exame)

OBS: SÓ DILATAM OS PACIENTES COM IDADE ATÉ 32 ANOS!!

DR. ALAN BOA VISÃO (DILATAR ATÉ 36 ANOS)

15 min.

30 min.

1º gota Mydriacyl ---> 2º gota Mydriacyl ---> Máquina (Exame)

EXAMES (NÃO PASSAR NA MÁQUINA).

CTD---> 1 gota de anestésico (tetracaína + fenilefrina) em cada olho

OBS: ESPERAR O INTERVALO DE 1 HORA PARA MEDIÇÃO.

15 min.

MAPEAMENTO ---> 1º gota Mydriacyl (Tropicamida) ---> 2º gota Mydriacyl ATENÇÃO: SE O PACIENTE TAMBÉM FOR FAZER CTD SÓ DEVE DILATAR NA TERCEIRA MEDIÇÃO.

PAQUIMETRIA ---> 1 gota de anestésico (tetracaína + fenilefrina) em cada olho

ATENÇÃO: PACIENTES COM GLAUCOMA E GESTANTES NÃO DILATAM.